Continue

المبادئ التوجيهية لنوبات حديثي الولادة 2017

وثيقة توصيات منظمة الصحة العالمية بشأن صحة الأطفال حديثي الولادة في وثيقة واحدة يسهل الوصول إليها لموظفي المنظمة وواضعي السياسات ومديري البرامج والمهنيين الصحيين. يمكن أن يساعد التجميع أيضًا في تحديد الثغرات بشكل أفضل لتحديد أولويات تحديثات المبادئ التوجيهية. - إن مجموعات توصيات منظمة الصحة العالمية بشأن صحة الأطفال حديثي الولادة التي أصدرتها جميع الإدارات ذات الصلة هي تلك التي تمت الموافقة عليها من قبل لجنة مراجعة المبادئ التوجيهية، 2017 - Final (Arabic... For Later0%0% found this document useful, undefined معايير خدمات التوليد و حديثي الولادة 0 ratings0% found this document useful (0 votes)1K viewsSaveSave

CHWsabbreviation. وزع ، الأطفال حديثي الولادة في المناطق الموبوءة بالملاريا ، لفحص الأم / الطفل توزيع مستلزمات رعاية الأطفال حديثي الولادة في أقرب وقت ممكن بعد الولادة في المنزل ، شجع النساء والقائمين على رعايتهم على زيارة مرفق صحي في حالة حدوث الولادة في المنزل ، شجع النساء والقائمين على رعايتهم على زيارة مرفق صحي في أقرب وقت ممكن بعد الولادة لفحص الأم / الطفل توزيع مستلزمات رعاية الأطفال حديثي الولادة في المناطق الموبوءة بالملاريا ، وزع

ين للمولود 8 تقدير أداء حصى الدواء حركة ، كيفما أمكن وأنحطوى 38 درجة مئوية) ، سوء التغذية ، قلة الحركة ، سحب شديد للصدر سرعة التنفس المعزولة: معدل التنفس> 60 نفسًا في الدقيقة ، انخفاض حرارة الجسم (درجة حرارة أقل من 35.5 درجة مئوية) ، انخفاض حرارة الجسم (درجة حرارة أقل من 35.5 درجة مئوية) ، سوء التغذية ، قلة الحركة ، سحب شديد للصدر سرعة التنفس المعزولة: معدل التنفس> 60 نفسًا في الدقيقة ، HIVabbreviation - (2 مريضة ، الأم ، LBWabbreviation ، الحمى أو الشعور بالبرد ، النوبات أو النشنجات). تحديد وذعم ، وإذا لزم الأمر ، إحالة الأطفال حديثي الولادة الذين يحتاجون إلى رعاية إضافية (على سبيل المثال

إيصال جميع المعلومات إليها بوضوح. إذا كان مرفق الرعاية الأولية مجهزًا لأداء الولادات الطبيعية ، راقب المخاض باستخدام مخطط المخاض وزع مجموعة مستلزمات رعاية الأطفال حديثي الولادة المخصصة للاستخدام المنزلي على العائلات التي لم تتسلمها على مستوى المجتمع المحلي شجع النساء على الخضوع للفحص وطلب الرعاية في مرفق صحي لأنفسهن قبل الولادة وأطفالهن حديثي الولادة بعد الولادة في المناطق الموبوءة بالملاريا ، وزع

تقديم لعلامات الخطر والاستشارة بشأن التعرف الفوري وطلب الرعاية (عدم التغذية بشكل جيد ، قلة النشاط ، صعوبة التنفس ، الحمى أو الشعور بالبرد ، النوبات أو النشنجات) تحديد ودعم وإحالة الأطفال حديثي الولادة الذين يحتاجون إلى رعاية إضافية (على سبيل المثال ، تقديم رعاية محترمة وداعمة للمرأة: الحفاظ على الخصوصية : شجعها على أن يكون لها رفيق ولادة ، واختيار وضعها الولادات والمساعدة في الولادة ، تعديل الإجراءات الطبية ، تقديم رعاية نظيفة وجافة للحبل. في الأماكن التي يسود فيها استخدام المواد الضارة على الحبال السريرة ، ضع 4

HIVabbreviation 3 الاختلال

60 دقيقة على الأقل تأخير الاستخدام لمدة 24 ساعة على الأقل لمنع فقدان الحرارة وانخفاض درجة حرارة الجسم. بدء الرضاعة الطبيعية الحصرية في أسرع وقت ممكن بعد الولادة ، أو على الأقل في غضون ساعة واحدة بعد الولادة. توفير رعاية نظيفة وجافة للحبل. في الأماكن التي يسود فيها استخدام المواد الضارة على الحبال السريرة ، ضع 4